

Oprekken van de slokdarm

bij passageklachten na een operatie

www.nwz.nl

Na een operatie aan de slokdarm kan er littekenweefsel ontstaan. Hierdoor wordt de slokdarm nauwer. Dit kan problemen geven met slikken. Ook zakt het eten hierdoor mogelijk niet goed meer. Dit noemen we passageklachten. Een behandeling hierbij is het oprekken van de slokdarm. In deze folder leest u hier meer informatie over.

■ De behandeling

Het is mogelijk om het littekenweefsel in de slokdarm op te rekken. Dit heet dilatatie. Tijdens een kijkonderzoek van de slokdarm en maag (gastroscopie) wordt de slokdarm wijder gemaakt. Dit gebeurt met een flexibele oprekstaaf (de zogenaamde Savary staaf) of een ballonnetje. Door het oprekken kan het voedsel beter zakken (passeren).

De behandeling moet meestal een paar keer herhaald worden.

■ Uw voorbereiding

Voor de ingreep moet u nuchter zijn. Dat betekent dat u na een bepaalde tijd niet meer mag eten, drinken en roken:

- **onderzoek 's ochtends:**
 - de dag voor het onderzoek mag u vanaf 24:00 uur 's nachts niet meer eten en drinken
 - roken is niet toegestaan
- **onderzoek 's middags:**
 - u mag tot 08:00 uur 's ochtends een licht ontbijt:
 - 1 beschuitje of ontbijtkoek met beleg en een kopje thee of koffie
 - daarna mag u alleen helder vloeibare dranken drinken tot 09:30 uur:
 - water, preOp-drank, limonade(siroop) zonder prik, thee / koffie zonder melk (eventueel met suiker of een zoetje), heldere appelsap
 - roken is niet toegestaan

Voor de ingreep krijgt u een roesje. Hiervoor krijgt u een infuusnaaldje in uw arm.

Na de ingreep kunt u rustig uitslapen op de uitslaapkamer. Als er geen complicaties zijn opgetreden mag u dezelfde dag weer naar huis.

■ **Mogelijke complicaties (risico's)**

Complicaties die kunnen optreden zijn het ontstaan van een gaatje (perforatie) of bloeding in de slokdarmwand of een longontsteking.

■ **Wanneer moet u contact met ons opnemen?**

Heeft u na het plaatsen van de stent last van:

- hevige buikpijn
- koorts (38 graden of hoger)
- flink bloedverlies (via mond of anus)
- pijn die niet weggaat
- hoesten bij elke hap of slok

Bel dan met de afdeling endoscopie. Op werkdagen tussen 8:30 en 16:30 belt u:

- locatie Alkmaar: 072 - 548 2850
- locatie Den Helder: 0223 - 69 6490
- locatie Schagen: 0224 - 53 2100

's Avonds, 's nachts en in het weekend belt u het algemene nummer van een van de locaties:

- locatie Alkmaar en Schagen: 072 - 548 4444
- locatie Den Helder: 0223 - 69 6969

U vraagt dan naar de dienstdoende MDL-arts.

■ **Uw vragen**

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met uw casemanager.

Noordwest Ziekenhuisgroep

Postbus 501
1800 AM Alkmaar
www.nwz.nl
tel 072 - 548 4444

Colofon

Redactie oncologie-chirurgie slokdarm- en maagkanker
communicatie
Druk Ricoh
Bestelnummer 264149

Op alle onderzoeken en behandelingen van Noordwest Ziekenhuisgroep zijn de algemene voorwaarden van Noordwest Ziekenhuisgroep van toepassing, zie www.nwz.nl