

Temozolomide

Uw internist-oncoloog heeft u het medicijn Temozolomide voorgeschreven. Temozolomide is een middel dat remmend werkt op de celgroei. Het wordt gebruikt bij de behandeling van kwaadaardige hersentumoren, ook wel maligne gliomen genoemd.

■ Dosering

Uw lengte en gewicht bepalen hoeveel Temozolomide u dagelijks nodig heeft. Uw internist-oncoloog berekent de dosis. Het is belangrijk dat u heel nauwkeurig de voorschriften opvolgt.

■ Uw medicatie

De volgende medicatie krijgt u voorgeschreven:

- Temozolomide gedurende 5 dagen per 4 weken
- Ondansetron 8 mg tegen de misselijkheid ½ uur voor inname van de Temozolomide

■ Gebruik van de medicatie

U start opmet inname vanmg

Temozolomide gedurende 5 dagen.

Vanaf de 2e kuur krijgt u in principe mg Temozolomide gedurende 5 dagen.

Apotheek

U krijgt een recept waarmee u naar de poliklinische ziekenhuisapothek gaat (huisnummer 020). Temozolomide is niet leverbaar door uw eigen apothek.

Mogelijke bijwerkingen

Temozolomide heeft over het algemeen milde bijwerkingen: het aantal rode en witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes kan dalen zonder dat u dit zelf merkt. Om dit goed in de gaten te houden, wordt er in de week voorafgaande aan de

start van de kuur bloed geprikt. Bij afwijkende waardes kan uw arts besluiten om de dosis aan te passen

Innemen

- u neemt de voorgeschreven dosis Temozolomide in met water
- een 1/2 uur voor het innemen van de capsules neemt u een middel in tegen misselijkheid. U krijgt hiervoor een recept mee.
- de capsules moet u 1 maal daags, bij voorkeur in de ochtend op een lege maag innemen
- neemt u de Temozolomide op een ander tijdstip in, dan moet u een uur voor én na het innemen van de capsules niets eten en drinken
- u mag de capsules niet fijnmaken of erop kauwen. Bijt u per ongeluk toch een capsule kapot? Drink dan extra water om eventuele medicijnresten weg te spoelen
- moet u (de eerste uren) na het innemen van de capsules overgeven? Neem dan geen nieuwe capsules in! Zelfs niet als u ziet dat u de capsule(s) heeft uitgebraakt. Het kan zijn dat u dan een te hoge dosis binnenkrijgt. Het is belangrijk dat u bij uw eerstvolgende afspraak op de polikliniek aan uw arts doorgeeft dat u heeft overgegeven
- bewaar de capsules bij kamertemperatuur op een veilige plaats
- was na het aanraken van de capsules u handen

Bijwerkingen van Temozolomide

De meest voorkomende bijwerkingen van Temozolomide zijn:

- slaperigheid en vermoeidheid
- gebrek aan eetlust
- hoofdpijn
- misselijkheid
- braken
- diarree of juist verstopping
- meer kans op infecties, bloedingen en/of bloedarmoede