

Borstamputatie met directe reconstructie bij DCIS

Bij een borstamputatie met directe reconstructie verwijdert de chirurg eerst het borstklierweefsel. De plastisch chirurg brengt vervolgens onder de borstspier een zogenoemde tissue expander in. Dit is een soort ballon die tijdens de operatie vaak wordt gevuld met een kleine hoeveelheid zoutoplossing. Deze expander vult de plastisch chirurg later een aantal keren bij tot het gewenste volume is bereikt. De huid en de spier worden op die manier geleidelijk aan opgerekt. De expander wordt na ongeveer een 1/2 jaar na de eerste operatie vervangen door een siliconen prothese. Het is de bedoeling dat uw borst wat betreft grootte en volume weer zoveel mogelijk lijkt op uw andere borst. Mocht het nodig zijn, dan kan de plastisch chirurg bij de gezonde borst nog een corrigerende borstlift of verkleining uitvoeren. U krijgt voor de operatie algehele anesthesie (narcose). De operatie duurt ongeveer 2 uur. Afhankelijk van uw situatie en herstel wordt u ongeveer 1 tot 2 dagen opgenomen.

■ Opname: uw afspraken

Voor de voorbereiding op de operatie krijgt u een afspraak op het opnameplein. Dit gebeurt meestal telefonisch. U heeft tijdens deze afspraak met diverse zorgverleners een gesprek zoals de anesthesioloog, de verpleegkundige en de apothekersassistent. Als u bloedverdunners gebruikt, heeft u ook een gesprek met een stollingsdeskundige. Het bezoek aan het opnameplein duurt ongeveer 1½ uur.

U ontvangt een brief over uw afspraak op het opnameplein. U vindt hierin informatie over:

- datum en tijdstip van uw afspraak
- op welk locatie u de afspraak heeft en
- hoe u zich op deze afspraak moet voorbereiden

Operatiedatum

U hoort van de medewerker van de planning:

- op welke datum u wordt geopereerd
- op welk tijdstip u in het ziekenhuis wordt verwacht
- vanaf welk tijdstip u niet meer mag eten en drinken

Folder en filmpje

Meer informatie vindt u in de brochure 'Goed voorbereid op uw operatie'. Hierin staat onder andere wat u moet doen om u goed voor te bereiden op de operatie. Deze folder staat klaar in uw patiëntenportaal Mijn Noordwest, maar wordt als het nodig is meegegeven of per post opgestuurd. U kunt op onze website www.nwz.nl/operatie ook een filmpje over de voorbereiding op de operatie bekijken. U ziet alleen wat u bewust op de operatieafdeling meemaakt.

■ Voorbereiding op de operatie

Voordat u wordt opgenomen, is het raadzaam een goede ondersteunende bh of een compressie bh aan te schaffen voor na de operatie. De verpleegkundig consulent/specialist mammacare informeert u hier verder over.

■ De operatie

U wordt opgenomen op een opnamekamer van een verpleegafdeling. Een verpleegkundige bereidt u daar voor op de operatie. Als u aan de beurt bent, wordt u naar de operatieafdeling gebracht. Nadat u onder narcose bent gebracht, verwijdert de chirurg het borstklierweefsel. Vervolgens brengt de plastisch chirurg de expander in onder de borstspier. Voor het afvoeren van vocht uit het wondgebied krijgt u 1 of 2 drain(s). De wond wordt onderhuids gehecht met oplosbare hechtingen en afgeplakt met een huidvriendelijke pleister. Voor compressie (druk) op het wondgebied krijgt u direct na de operatie een elastische band (spica) om.

■ Een patholoog onderzoekt het verwijderde borstklierweefsel

Na de operatie onderzoekt een patholoog het verwijderde borstklierweefsel. Er wordt onderzocht of de snijvlakken vrij zijn van DCIS en of er geen borstkanker aanwezig is.

■ Na de operatie

Voor deze operatie gaat u onder algehele narcose. Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer. Als alle controles bij u goed zijn, haalt een verpleegkundige u op en brengt u naar de verpleegafdeling. Op de afdeling controleert de verpleegkundige regelmatig:

- uw bloeddruk, pols en temperatuur
- uw wond op zwellings, kleur en de hoeveelheid wondvocht in de drain

Tegen de pijn krijgt u pijnstillers. Voor zover de pijn het toelaat, mag u uw arm aan de geopereerde kant gebruiken. Maar til uw arm niet te hoog op: de schouder mag niet hoger komen dan 90 graden (de elleboog mag dan tot schouderhoogte komen). Op de dag na de operatie of de daaropvolgende dag mag u zo mogelijk na de artsensite naar huis. Vanaf 2 weken na de operatie mag u de arm wel weer gewoon volledig bewegen (dus ook geheel omhoog). Kracht zetten met de arm en tillen mag u de eerste 6 weken na de operatie niet doen.

■ Begeleiding

U wordt zo goed mogelijk ondersteund door de verpleegkundigen van de afdeling. De verpleegkundig consulent/specialist mammacare belt u op de eerste werkdag na uw thuiskomst op om te informeren hoe het met u gaat. Bij ontslag uit het ziekenhuis op vrijdag wordt u de 1^e werkdag na het weekend gebeld.

■ Instructies en leefregels voor thuis

Voor goed herstel is het belangrijk dat u zich thuis houdt aan de volgende instructies en leefregels:

- de pleister moet blijven zitten tot na de controleafspraak bij de plastisch chirurg. Is intussen de pleister vochtig of vies geworden, dan mag u de pleister verwijderen. Deze hoeft u niet te vervangen

- u mag 2 dagen na de operatie weer douchen
- afhankelijk van de hoeveelheid wondvocht houdt u de drains 2 tot 7 dagen. Soms kan de drain voor ontslag worden verwijderd, maar vaak gaat u met een drain naar huis. Het wondvocht wordt opgevangen in drainflesjes. U krijgt op de verpleegafdeling voor deze flesjes een schoudertasje mee. Meet en noteer elke dag op een vast tijdstip de hoeveelheid wondvocht in de drainflesjes. De drain blijft maximaal 1 week zitten. Vanaf 48 uur na de operatie mag u met de drains gewoon douchen. U mag dan de spica of compressie-/sport bh onder de douche afdoen
- u draagt de week na de operatie dag en nacht een elastische band (spica). Als de drains zijn verwijderd, draagt u een compressie bh/ of sport bh. Ook deze draagt u dag en nacht. Dit in totaal 6 weken
- tegen de pijn mag u 4 keer per dag 1000mg paracetamol gebruiken. En zo nodig krijgt u in overleg met de plastisch chirurg extra pijnmedicatie. Neem de pijnstillers de eerste dagen na de operatie op vaste tijden in. Is de pijn draaglijk voor u, dan mag u als eerste de extra pijnmedicatie afbouwen. Daarna vermindert u de paracetamol. Heeft u toch nog veel pijn en is deze niet dragelijk met de voorgeschreven medicatie? Neem dan contact op met de polikliniek plastische chirurgie
- voor zover de pijn het toelaat, mag u uw arm bewegen en gebruiken. Maar til uw arm niet hoger dan 90 graden. Uw elleboog mag dan tot schouderhoogte maar niet hoger
- u mag uw arm de eerste 6 weken niet te zwaar belasten. U mag ook niet zwaar tillen, ten hoogste tot 1 kilo
- u mag de eerste 6 weken niet op uw buik slapen. Op uw zij mag wel
- voor zover de pijn het toelaat, en u verantwoord kan deelnemen aan het verkeer, mag u autorijden. Fietsen mag pas 2 - 3 weken na de operatie
- u mag de eerste 6 weken na de operatie niet sporten. Wandelen is wel direct na de operatie toegestaan

■ Wanneer waarschuwt u het ziekenhuis?

Waarschuw het ziekenhuis bij:

- toenemende zwelling en spanning rondom het wondgebied
- kleurverandering of roodheid van het wondgebied

- bij toenemende pijn
- koorts: hoger dan 38,5 graden
- als het drainflesje vol is of als het vacuüm van het drainflesje af is (het vacuüm is eraf als het groene dopje niet meer samengetrokken is)

Neem dan op werkdagen van 8:30 tot 16:30 uur contact op met de polikliniek plastische chirurgie van locatie Alkmaar: telefoon 072 - 548 2550.

's Avonds, 's nachts of in het weekend neemt u bij ernstige klachten contact op met de afdeling spoedeisende hulp. Contactgegevens vindt u in hoofdstuk 3. Geef dan aan dat u onder behandeling bent bij de dienstdoende plastisch chirurg. De spoedeisende hulp zal dan overleg hebben met de dienstdoend plastisch chirurg.

Wilt u **niet** uw huisarts met bovenstaande klachten benaderen? De plastisch chirurg wil graag direct ingelicht worden op het moment dat u bovenstaande klachten ervaart.

■ Controle

U komt ongeveer 10 tot 14 dagen na uw operatie bij de plastisch chirurg voor controle. De cupmaat kan na de operatie tijdelijk verschillend zijn. Voor het aanmeten van een tijdelijke borstprothese kunt u een afspraak maken bij de verpleegkundig consulent/specialist mammacare als de drains zijn verwijderd.

Na ongeveer 7 werkdagen komt u voor controle bij de chirurg en voor de uitslag van het weefselonderzoek. Aansluitend heeft u dan ook een afspraak met de verpleegkundig consulent/specialist mammacare.

■ Bijvullen van de expander

Ongeveer 1-3 weken na de operatie begint de plastisch chirurg met het bijvullen van de expander. Dit gebeurt poliklinisch. Met een dun naaldje spuit de plastisch chirurg een zoutoplossing door de huid via een vulventiel in de expander. Dit is niet pijnlijk. Verdoving is dan ook niet nodig. Het bijvullen geeft wel een gevoel van spanning op de huid. Afhankelijk van de grootte van de borst wordt de expander meerdere keren bijgevuld. Na de laatste vulling wordt een geschik-

te prothese uitgekozen.

■ Plaatsen van de prothese

Als de huid na 3-6 maanden gewend is aan de nieuwe vorm en positie, plaatst de plastisch chirurg de prothese. U wordt hiervoor 2 dagen opgenomen. Over het algemeen voelt u zich wel na 2 weken weer fit. Na de operatie draagt u weer 6 weken een compressie bh of elastische band (spica). Gedurende deze 6 weken mag u ook niet zwaarder tillen dan 1 kilo en niet sporten.

■ Uw vragen

De plastisch chirurg is na de operatie uw aanspreekpunt met vragen over de wondgenezing, problemen, pijnklachten, pijnstilling en/of koorts. De plastisch chirurg is bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 16:30 uur via telefoonnummer 072 - 548 2550.

Voor overige vragen omtrent de behandeling van uw DCIS kunt u terecht bij de mammacareverpleegkundige op de borstkliniek.