

## Verwijscriteria bij verdenking colorectaalcarcinoom:

### Verwijscriteria

Verdenking colon- of rectumcarcinoom op basis van:

- Leeftijd > 50 jaar en of positieve familieanamnese voor colorectaalcarcinoom met 1 of meer alarmsymptomen
  - Rectaal bloedverlies
  - Veranderd ontlastingspatroon
  - Ferriprievae anaemie

### Vorbereiding door huisarts

**verwijzing via beter verwijzen / fax naar MDLarts**  
medisch journaal( voorgeschiedenis en medicijngebruik vermelden in digitaal verwijzing)  
Patiënt informeren over oproep door afdeling MDL en bespreken met patiënt mogelijkheid van kwaadaardige aandoening?  
Het verdient aanbeveling om een familielid mee te nemen

### Traject in ziekenhuis

1<sup>e</sup> bezoek:  
Informatie gesprek MDL arts over coloscopie, gevolgd door een voorlichtings gesprek over coloscopie door verpleegkundige MDL afdeling.  
Indien verdenking maligniteit verwijzing naar fast track procedure (link naar zorgpadsite)  
2<sup>e</sup> bezoek (min. 2 max 3 werkdagen na coloscopie)  
Consult MDL arts bespreken Pa-uitslag en aansluitend consult casemanager colorectaalcarcinoom. (link naar zorgpadsite)  
Disseminatie onderzoek vindt < 1 week plaats en patiënt wordt < 1 week besproken op MDOCRC waar beleid wordt gemaakt  
Patiënt krijgt afspraak bij chirurg voor bespreken uitslagen en behandelplan welke in het MDO is besproken

### Aanwijzing voor patiënt

Het verdient aanbeveling om een familielid mee te nemen naar de uitslag gesprekken met de arts